



**КонсультантПлюс**

Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913  
(ред. от 21.02.2020)

"Об утверждении методических рекомендаций  
по определению потребности в наркотических  
средствах и психотропных веществах,  
предназначенных для медицинского  
применения"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 17.02.2025

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ**  
**от 16 ноября 2017 г. N 913**

### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

Приказываю:

Утвердить прилагаемые методические [рекомендации](#) по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения.

Министр  
В.И.СКВОРЦОВА

Утверждены  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 16 ноября 2017 г. N 913

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

1. Настоящие методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения (далее - Методические рекомендации), подготовлены в рамках исполнения [пункта 9](#) плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 1403-р <1>.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 29, ст. 4849.

2. Методические рекомендации могут применяться для определения:

1) субъектами Российской Федерации общей годовой региональной потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, внесенных в [списки II и III](#) перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <2>, зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения (далее соответственно - региональная потребность, наркотические лекарственные препараты, психотропные лекарственные препараты);

-----  
<2> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, ст. 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805; 2016, N 15, ст. 2088; 2017, N 4, ст. 671; N 10, ст. 1481; N 23, ст. 3330; N 30, ст. 4664; N 33, ст. 5182).

2) медицинскими организациями и иными организациями, оказывающими медицинскую помощь (далее - медицинские организации), потребности в наркотических лекарственных препаратах и психотропных лекарственных препаратах, необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

3. Определение региональной потребности рекомендуется проводить в рамках подготовки сводной заявки на наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, направляемой ежегодно в Минпромторг России в соответствии с [Правилами](#) распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 558 <3>.

-----  
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4256; 2011, N 51, ст. 7534; 2012, N 37, ст. 5002; 2013, N 9, ст. 965; N 51, ст. 6869; 2016, N 35, ст. 5349; 2017, N 6, ст. 929; N 27, ст. 4052.

4. При определении региональной потребности рекомендуется учитывать следующие факторы:

1) специфику применения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в конкретном субъекте Российской Федерации;

2) показатели смертности пациентов от злокачественных новообразований (ЗНО), терминальной стадии ВИЧ-инфекции (СПИД), иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний (ИНПЗ);

3) количество пациентов с болевым синдромом, в том числе хроническим, нуждающихся в обезболивании (со злокачественными новообразованиями, терминальной стадии ВИЧ-инфекции (СПИД), иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями (ИНПЗ);

4) номенклатуру коечного фонда по профилям медицинской помощи и количество вызовов скорой медицинской помощи в конкретном субъекте Российской Федерации.

5. Региональную потребность рекомендуется формировать из:

1) общей потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, применяемых при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в стационарных условиях и условиях дневного стационара (далее - медицинская помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара);

(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

2) общей потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, применяемых при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (далее - медицинская помощь в амбулаторных условиях);

3) общей потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, применяемых при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации.

6. Региональную потребность, предусмотренную [пунктом 5](#) Методических рекомендаций, рекомендуется формировать:

1) для наркотических лекарственных препаратов:

а) на основании полученных от медицинских организаций потребностей в указанных лекарственных препаратах;

б) в соответствии с примерной номенклатурой наркотических лекарственных препаратов согласно [приложению N 1](#) к Методическим рекомендациям, которую рекомендуется формировать на основании информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения <4>;

-----

<4> **Статья 33** Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2014, N 52, ст. 7540), **приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 80н "Об утверждении порядка ведения государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2016 г., регистрационный N 41471) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. N 731н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2016 г., регистрационный N 43894).

в) с учетом особенностей расчетов потребности в наркотических лекарственных препаратах, предназначенных для купирования персистирующего болевого синдрома в амбулаторных условиях у взрослых пациентов, детей и подростков, указанных в **пунктах 10 и 11** Методических рекомендаций;

2) для психотропных лекарственных препаратов - на основании полученных от медицинских организаций сведений о потребности в указанных лекарственных препаратах.

7. Медицинским организациям рекомендуется осуществлять расчет потребности:

1) в наркотических лекарственных препаратах в соответствии с установленными нормативами для расчета потребности в наркотических лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения <5>, и с учетом особенностей расчетов потребности в наркотических лекарственных препаратах, предназначенных для купирования персистирующего болевого синдрома в амбулаторных условиях у взрослых пациентов, детей и подростков, указанных в **пунктах 10 и 11** Методических рекомендаций;

-----

<5> **Приказ** Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 917н "Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44808) (далее - приказ N 917н).

2) в психотропных лекарственных препаратах путем усреднения данных отчетов об использовании психотропных веществ за последние три года, представляемых ими в установленном порядке <6>, с учетом увеличения, но не более чем в 1,5 раза, использования психотропных лекарственных препаратов в прогнозируемый период <7>, если в этом возникла необходимость.

-----

<6> **Правила** представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 46, ст. 4795; 2008, N 50,

ст. 5946; 2010, N 25, ст. 3178; 2012, N 37, ст. 5002; 2013, N 6, ст. 558; N 51, ст. 6869; 2015, N 33, ст. 4837; 2017, N 2, ст. 375; N 27, ст. 4052).

<7> [Пункт 2](#) приказа N 917н.

8. Рассчитанная потребность в наркотических лекарственных препаратах может отличаться от фактической потребности в конкретных наименованиях наркотических лекарственных препаратов для различных видов медицинских организаций.

Расчет фактической потребности в конкретных наименованиях наркотических лекарственных препаратов рекомендуется осуществлять медицинскими организациями на основании расчетной потребности или на основании расчетной потребности с учетом сравнения ее с данными о фактическом либо максимальном фактическом потреблении наркотических лекарственных препаратов за предыдущий год (годы).

9. Расчет потребности в наркотических лекарственных препаратах, применяемых при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, рекомендуется осуществлять медицинскими организациями по конкретному международному непатентованному наименованию наркотического лекарственного препарата следующим образом:

$$P = (N^1 \times K^1) + (N^2 \times K^2) + (N^3 \times K^3) \dots (N^n \times K^n),$$

где:

P - расчетная потребность (г);

N1, N2, N3, ... Nn - норматив для расчета потребности конкретного наркотического лекарственного препарата, установленный в соответствии с профилем медицинской помощи (г);  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

K1, K2, K3, ... Kn - количество пациентов, получивших медицинскую помощь по соответствующему профилю (ед.).  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

10. Расчет потребности в наркотических лекарственных препаратах, предназначенных для купирования персистирующего болевого синдрома при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях у взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), терминальной стадией ВИЧ-инфекции (СПИД) и иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями (ИНПЗ), рекомендуется осуществлять для конкретных наименований и лекарственных форм наркотических лекарственных препаратов следующим образом:

$$M = N \times H \times J \times Q / G,$$

где:

M - количество вторичных (потребительских) упаковок наркотических лекарственных препаратов на курс терапии на нуждающихся пациентов (шт.);

N - количество умерших пациентов (80% от количества умерших пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), 50% от количества умерших пациентов с

терминальной стадией ВИЧ-инфекции (СПИД), 10% от количества умерших пациентов при иных неизлечимых прогрессирующих заболеваниях (ИНПЗ) (чел.);

N - рекомендуемый коэффициент распределения наркотических лекарственных препаратов по лекарственным формам для пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), терминальной стадией ВИЧ-инфекции (СПИД), иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями (ИНПЗ) при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях ([приложение N 2](#) к Методическим рекомендациям) или рекомендуемый коэффициент распределения наркотических лекарственных препаратов, применяемых для терапии умеренной и сильной боли в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, по международным непатентованным наименованиям для пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО), терминальной стадией ВИЧ-инфекции (СПИД), иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями (ИНПЗ) при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях ([приложение N 3](#) к Методическим рекомендациям);

J - количество наркотических лекарственных препаратов (таблетка, капсула, ампула, трансдермальная терапевтическая система) на 1 пациента (шт.);

Q - длительность курса терапии обезболивания (от 30 до 90 дней) (день);

G - количество единиц лекарственной формы наркотического лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке (шт.).

11. Расчет потребности в наркотических лекарственных препаратах, предназначенных для купирования персистирующего болевого синдрома при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях у детей и подростков, рекомендуется осуществлять для конкретных наименований наркотических лекарственных препаратов в зависимости от длительности их действия (короткого действия или пролонгированного действия) следующим образом:

1) для препаратов морфина короткого действия:

$$J = M \times I / F,$$

где:

J - количество вторичных (потребительских) упаковок препаратов морфина короткого действия на расчетный год на общее количество детей и подростков, нуждающихся в обезболивании (шт.);

M - количество умерших детей и подростков за предыдущий год в субъекте Российской Федерации (чел.);

I - суммарная доза морфина короткого действия, необходимая для использования в течение 1 года, на одного ребенка или подростка (мг);

F - количество морфина во вторичной (потребительской) упаковке препарата морфина короткого действия (мг);

2) для препаратов морфина пролонгированного действия:



---

$$K = M \times H,$$

где:

K - количество вторичных (потребительских) упаковок препаратов морфина пролонгированного действия на расчетный год на общее количество детей и подростков, нуждающихся в обезболивании (шт.);

M - количество умерших детей и подростков за предыдущий год в субъекте Российской Федерации (чел.);

H - суммарная доза морфина пролонгированного действия, необходимая для использования в течение 1 года, на одного ребенка или подростка (мг).

3) для препаратов фентанила короткого действия:

$$P = M \times L / 150,$$

где:

P - количество вторичных (потребительских) упаковок препаратов фентанила короткого действия на расчетный год на общее количество детей и подростков, нуждающихся в обезболивании (шт.);

M - количество умерших детей и подростков за предыдущий год в субъекте Российской Федерации (чел.);

L - суммарная доза фентанила короткого действия, необходимая для использования в течение 1 года, на одного ребенка или подростка (мг).

4) для препаратов фентанила пролонгированного действия:

$$Q = M \times N / 37,5 / 3,$$

где:

Q - количество вторичных (потребительских) упаковок препаратов фентанила пролонгированного действия на расчетный год на общее количество детей и подростков, нуждающихся в обезболивании (шт.);

M - количество умерших детей и подростков за предыдущий год в субъекте Российской Федерации (чел.);

N - суммарная доза фентанила пролонгированного действия, необходимая для использования в течение 1 года, на одного ребенка или подростка (мг).



Приложение N 1  
к методическим рекомендациям  
по определению потребности  
в наркотических средствах  
и психотропных веществах,  
предназначенных для медицинского  
применения, утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 16 ноября 2017 г. N 913

## ПРИМЕРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

| N<br>п/п | Международное<br>непатентованное<br>наименование<br>наркотического<br>лекарственного<br>препарата | Единица<br>изме-<br>ре-<br>ния | Лекарствен-<br>ная форма                                   | Дозировка        | Содержание<br>действующего<br>наркотического<br>средства в 1<br>лекарственной<br>форме, граммов |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Бупренорфин                                                                                       | ампула                         | раствор для<br>инъекций                                    | 0,3 мг/мл 1,0 мл | 0,0003                                                                                          |
|          |                                                                                                   | пластырь                       | пластырь<br>трансдермаль-<br>ный                           | 35 мкг/час       | 0,02                                                                                            |
|          |                                                                                                   |                                |                                                            | 52,5 мкг/час     | 0,03                                                                                            |
|          |                                                                                                   |                                |                                                            | 70 мкг/час       | 0,04                                                                                            |
| 2        | Бупрено-<br>рфин+налоксон                                                                         | таблетка                       | таблетки<br>подъязычные                                    | 0,2 мг + 0,2 мг  | 0,0002                                                                                          |
| 3        | Дигидрокодеин                                                                                     | таблетка                       | таблетки с<br>пролонгиро-<br>ванным<br>высвобожде-<br>нием | 60 мг            | 0,06                                                                                            |
|          |                                                                                                   |                                |                                                            | 90 мг            | 0,09                                                                                            |
|          |                                                                                                   |                                |                                                            | 120 мг           | 0,12                                                                                            |
| 4        | Морфин                                                                                            | таблетка                       | таблетки с<br>быстрым<br>высвобожде-<br>нием               | 5 мг             | 0,005                                                                                           |
|          |                                                                                                   |                                |                                                            | 10 мг            | 0,01                                                                                            |
|          |                                                                                                   | ампула<br>полиме               | раствор для<br>приема                                      | 2 мг/мл 5,0 мл   | 0,01                                                                                            |

|  |  |                      |                                                                      |                 |      |
|--|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|  |  | рная                 | внутри                                                               | 6 мг/мл 5,0 мл  | 0,03 |
|  |  |                      |                                                                      | 20 мг/мл 5,0 мл | 0,1  |
|  |  | таблетка,<br>капсула | таблетки,<br>капсулы с<br>пролонгиро<br>ванным<br>высвобожде<br>нием | 10 мг           | 0,01 |
|  |  |                      |                                                                      | 30 мг           | 0,03 |
|  |  |                      |                                                                      | 60 мг           | 0,06 |
|  |  |                      |                                                                      | 100 мг          | 0,1  |
|  |  | ампула               | раствор для<br>инъекций                                              | 10 мг/мл 1,0 мл | 0,01 |

(п. 4 в ред. Приказа Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

|   |                                                          |        |                                       |                                                    |                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5 | Кодеин + Морфин<br>+ Носкапин +<br>Папаверин +<br>Тебаин | ампула | раствор для<br>подкожного<br>введения | 1,44 + 11,5 + 5,4<br>+ 0,72 + 0,1<br>мг/мл 1,0 мл  | Кодеин -<br>0,00144;<br>Морфин -<br>0,0115;<br>Тебаин - 0,0001   |
|   |                                                          |        |                                       | 0,72 + 5,75 + 2,7<br>+ 0,36 + 0,05<br>мг/мл 1,0 мл | Кодеин -<br>0,00072;<br>Морфин -<br>0,00575;<br>Тебаин - 0,00005 |

(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

|   |                                       |          |                                                          |               |       |
|---|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 6 | Оксикодон,<br>Налоксон +<br>Оксикодон | таблетка | таблетки с<br>пролонгиро<br>ванным<br>высвобожде<br>нием | 2,5 мг + 5 мг | 0,005 |
|   |                                       |          |                                                          | 5 мг + 10 мг  | 0,01  |
|   |                                       |          |                                                          | 10 мг + 20 мг | 0,02  |
|   |                                       |          |                                                          | 20 мг + 40 мг | 0,04  |

(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

|   |              |                 |                         |               |       |
|---|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------|
| 7 | Тримеперидин | ампула          | раствор для<br>инъекций | 10 мг/мл 1 мл | 0,01  |
|   |              |                 |                         | 20 мг/мл 1 мл | 0,02  |
|   |              | таблетка        | таблетки                | 25 мг         | 0,025 |
|   |              | шприц-т<br>юбик | раствор для<br>инъекций | 20 мг/мл 1 мл | 0,02  |

|   |                                           |          |                                                                       |                  |         |
|---|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 8 | Пропионилфени<br>лэтоксиэтилпи<br>перидин | таблетка | таблетки<br>защечные                                                  | 20 мг            | 0,02    |
| 9 | Фентанил                                  | пластырь | пластырь<br>трансдермаль<br>ный                                       | 12,5 мкг/час     | 0,0021  |
|   |                                           |          |                                                                       | 25 мкг/час       | 0,0042  |
|   |                                           |          |                                                                       | 50 мкг/час       | 0,0084  |
|   |                                           |          |                                                                       | 75 мкг/час       | 0,0126  |
|   |                                           |          |                                                                       | 100 мкг/час      | 0,0168  |
|   |                                           | ампула   | раствор для<br>внутривен<br>ного и<br>внутримыше<br>чного<br>введения | 50 мкг/мл 1,0 мл | 0,00005 |
|   |                                           |          |                                                                       | 50 мкг/мл 2,0 мл | 0,0001  |
|   |                                           | спрей    | спрей<br>назальный                                                    | 50 мкг/доза      | 0,00005 |
|   |                                           |          |                                                                       | 100 мкг/доза     | 0,0001  |
|   |                                           |          |                                                                       | 200 мкг/доза     | 0,0002  |

(п. 9 в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

Приложение N 2  
к методическим рекомендациям  
по определению потребности  
в наркотических средствах  
и психотропных веществах,  
предназначенных для медицинского  
применения, утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 16 ноября 2017 г. N 913

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ЗНО), ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(СПИД), ИНЫМИ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
(ИНПЗ) ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

### В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ <\*>

| Лекарственная форма наркотического лекарственного препарата                                    |                                               | Рекомендуемый коэффициент распределения |                                         |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                               | ЗНО                                     | Терминальная стадия ВИЧ-инфекции (СПИД) | Иные неизлечимые прогрессирующие заболевания (ИНПЗ) |
| Требуется применение наркотических лекарственных препаратов короткого действия                 | Инвазивные формы                              | 10%                                     | 5%                                      | 1%                                                  |
|                                                                                                | Неинвазивные формы                            | 10%                                     | 5%                                      | 1%                                                  |
| Требуется применение неинвазивных пролонгированных форм наркотических лекарственных препаратов | Трансдермальные терапевтические системы (ТТС) | 20%                                     | 15%                                     | 5%                                                  |
|                                                                                                | Пероральные формы                             | 40%                                     | 25%                                     | 3%                                                  |

-----

<\*> Расчет рекомендуется осуществлять исходя из числа пациентов, умерших от злокачественных новообразований (ЗНО), в терминальной стадии ВИЧ-инфекции (на стадии СПИДа), иных неизлечимых прогрессирующих заболеваний (ИНПЗ) за предшествующий год, принятых за 100%.

Приложение N 3  
к методическим рекомендациям  
по определению потребности  
в наркотических средствах  
и психотропных веществах,  
предназначенных для медицинского  
применения, утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 16 ноября 2017 г. N 913

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ТЕРАПИИ УМЕРЕННОЙ И СИЛЬНОЙ БОЛИ

**В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НЕПАТЕНТОВАННЫМ  
НАИМЕНОВАНИЯМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ЗНО), ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(СПИД), ИНЫМИ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
(ИНПЗ) <\*> ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

| Международное<br>непатентованное<br>наименование<br>наркотического<br>лекарственного<br>препарата | Лека<br>рственная<br>форма                | Дозиро<br>вка                                 | Количе<br>ство в<br>по<br>треби<br>тель<br>ской<br>упако<br>вке | Рекомендуемый коэффициент<br>распределения                  |                                                          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                           |                                               |                                                                 | Злокаче<br>ствен<br>ные<br>новоо<br>бразова<br>ния<br>(ЗНО) | Терми<br>нальная<br>стадия<br>ВИЧ-и<br>нфекции<br>(СПИД) | Иные<br>неизлечимые<br>прогресси<br>рующие<br>заболевания<br>(ИНПЗ) <*> |
|                                                                                                   |                                           |                                               |                                                                 | Не требуется наркотический<br>лекарственный препарат        |                                                          |                                                                         |
|                                                                                                   |                                           |                                               |                                                                 | 20%                                                         | 50%                                                      | 90%                                                                     |
| 1. Наркотические лекарственные препараты короткого действия, в том числе:                         |                                           |                                               |                                                                 |                                                             |                                                          |                                                                         |
| 1.1. Инвазивные наркотические лекарственные<br>препараты                                          |                                           |                                               |                                                                 | 8%                                                          | 5%                                                       | 1%                                                                      |
| Тримеперидин                                                                                      | раствор<br>для<br>инъекций                | 20 мг/мл                                      | 5                                                               | 1%                                                          | 0,5%                                                     | 0,1%                                                                    |
| Кодеин +<br>Морфин +<br>Носкапин +<br>Папаверин +<br>Тебаин                                       | раствор<br>для подко<br>жного<br>введения | 1,44 +<br>11,5 + 5,4<br>+ 0,72 +<br>0,1 мг/мл | 5                                                               | 1%                                                          | 0,5%                                                     | 0,1%                                                                    |
| Морфин                                                                                            | раствор<br>для<br>инъекций                | 10 мг/мл                                      | 10                                                              | 6%                                                          | 4%                                                       | 0,8%                                                                    |
| 1.2. Неинвазивные наркотические лекарственные<br>препараты                                        |                                           |                                               |                                                                 | 17%                                                         | 10%                                                      | 4%                                                                      |

|                                                                                   |                                                      |                    |    |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|------|------|-------|
| Пропионил-фенилэтокси-этилпиридин                                                 | таблетки<br>защечные                                 | 20 мг              | 10 | 2%   | 1%   | 0,5%  |
| Бупренорфин + Налоксон                                                            | таблетки<br>подъязычные                              | 0,2 мг + 0,2 мг    | 20 | 1%   | 1%   | 0,5%  |
| Тримеперидин                                                                      | таблетки                                             | 25 мг              | 10 | 0,5% | 0,5% | 0,1%  |
| Морфин                                                                            | таблетки                                             | 5 мг               | 20 | 2%   | 1%   | 0,5%  |
|                                                                                   |                                                      | 10 мг              | 20 | 3,5% | 1,5% | 1%    |
|                                                                                   | раствор<br>для приема<br>внутрь                      | 2 мг/мл<br>5,0 мл  | 20 | 1%   | 0,5% | 0,25% |
|                                                                                   |                                                      | 6 мг/мл<br>5,0 мл  | 20 | 3%   | 1,5% | 0,5%  |
|                                                                                   |                                                      | 20 мг/мл<br>5,0 мл | 20 | 0,5% | 1%   | 0,25% |
| Фентанил                                                                          | спрей<br>назальный                                   | 50<br>мкг/доза     | 20 | 0,5% | 0,5% | 0,1%  |
|                                                                                   |                                                      | 100<br>мкг/доза    | 20 | 1,5% | 1%   | 0,2%  |
|                                                                                   |                                                      | 200<br>мкг/доза    | 20 | 1,5% | 0,5% | 0,1%  |
| 2. Наркотические лекарственные препараты пролонгированного действия               |                                                      |                    |    |      |      |       |
| 2.1. Пероральные наркотические лекарственные препараты пролонгированного действия |                                                      |                    |    | 35%  | 20%  | 3%    |
| Налоксон + Оксикодон                                                              | таблетки с<br>пролонгирован<br>ным<br>высвобождением | 2,5 мг + 5 мг      | 20 | 1,5% | 0,5% | 0,5%  |
|                                                                                   |                                                      | 5 мг + 10 мг       | 20 | 4%   | 5%   | 0,5%  |
|                                                                                   |                                                      | 10 мг + 20 мг      | 20 | 7%   | 5%   |       |
|                                                                                   |                                                      | 20 мг + 40 мг      | 20 | 4,5% | 1%   |       |
| Морфин                                                                            | капсулы,<br>таблетки с                               | 10 мг              | 20 | 2,5% | 0,5% | 1,5%  |

|                                                                                     |                                 |              |    |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----|------|-----|------|
|                                                                                     | пролонгированным высвобождением | 30 мг        | 20 | 7,5% | 4%  | 0,5% |
|                                                                                     |                                 | 60 мг        | 20 | 5,5% | 3%  |      |
|                                                                                     |                                 | 100 мг       | 20 | 2,5% | 1%  |      |
| 2.3. Трансдермальные терапевтические системы наркотических лекарственных препаратов |                                 |              |    | 20%  | 15% | 2%   |
| Фентанил                                                                            | пластырь трансдермальный        | 12,5 мкг/час | 5  | 1%   | 1%  | 1%   |
|                                                                                     |                                 | 25 мкг/час   | 5  | 4%   | 3%  | 0,5% |
|                                                                                     |                                 | 50 мкг/час   | 5  | 8%   | 6%  | 0,5% |
|                                                                                     |                                 | 75 мкг/час   | 5  | 5%   | 3%  |      |
|                                                                                     |                                 | 100 мкг/час  | 5  | 2%   | 2%  |      |

Примечание:

При государственной регистрации новых наркотических лекарственных препаратов коэффициент распределения может изменяться в соответствии с их потребностью.

-----

<\*> Иные неизлечимые прогрессирующие заболевания (ИНПЗ): хроническая острая почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, цирроз печени, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие деменции, ревматоидный артрит, сахарный диабет, мультирезистентный туберкулез.